



КОНСУЛЬТАЦІЯ

«Якщо дитину
вжалила бджола»





Бджоли та оси становлять велику групу загону перетинчастокри-
лих. Контакти дітей з бджолами і осамаи відбуваються частіше, ніж з
іншими отруйними тваринами. При ураженні бджола гостру зброю з
силою встромляє в шкіру і токсин проникає в кров потерпілого. Уколи
наносять тільки самки.

Поодинокі жалення бджіл здорові люди переносять легко. Вони,
як правило, викликають місцеву реакцію. Шкіра червоніє, з'являється
припухлість, відчувається сильна болючість, печіння, свербіж. Однак,
сильну токсичну реакцію викликають навіть поодинокі жалення в
голову, кровоносну судину, в порожнину рота. При цьому з'являються
запаморочення, головний біль, нудота, слабкість. Іноді відзначається
блювота, підвищення температури тіла, непритомність.

Є діти особливо чутливі до отрути перетинчастокрилих комах.
Крім звичайних реакцій, у них при повторному вжалені виникають
кропив'янка, слъозотеча, рясні виділення з носа. У важких випадках
можливий набряк гортані - ускладнення, що вимагає екстреної
медичної допомоги.

Частота виникнення алергічних реакцій на жалення осамаи та
бджолами дуже велика. У чутливих дітей різка реакція може розви-
нутися у відповідь на одне укусу. Слід зауважити, що жалення бджолами
більш важкі, ніж укуси ос і джмелів, так як перші залишають в ранці
жало з отруйною залозою.

Якщо дитину вжалила бджола, перш за все необхідно видалити жало з місця ураження. Цю процедуру потрібно робити обережно, щоб не выдавити вміст отруйної залози в ранку. Після вилучення жало слід знищити, інакше, потрапивши випадково на шкіру, воно може знову встромитися з допомогою скорочення м'язів отруйної залози. Потім на місце ураження кладуть лід або рушник, змочений холодною водою. Використовувати для охолодження землю, глину, як часом роблять, не можна - це може привести до інфікування, розвитку правця.

У тому випадку, коли реакція на укусу комахи бурхлива, необхідна невідкладна медична допомога. Тому слід якомога швидше викликати лікаря і доставити потерпілого до найближчої лікувальної установи. До прибуття лікаря треба вкласти дитину, високо піднявши йому голову. Можна дати дитині таблетку протиалергійного засобу.

